

Manuscrit
Lombard

2. Mémoire Sur Les Loupes.

Les Tumeurs Communes Communément Sous Le
nom de Loupes peuvent Survenir Sans presque
toute la partie externe du Corps. Leur caractère
est tout différent de toutes Tumeurs inguérales,
en ce qu'elles sont sans Siège qui Sans Le tissu
adipeux, & ne sont presque jamais accompagnées
de douleur & d'inflammation sans la gradation
de leur accroissement.

Pour donner la Définition des Loupes on
pourrait dire que ce sont des Tumeurs en Kistes qu'on
à rangé sous trois classes, relativement à l'humour
qu'elles contiennent, mais cela en forme que c'est
différences accidentelles.

La cause formelle des Loupes est une accumulation
de Sucs lymphatiques & adipeux qui prennent ces
couleurs & des consistances différentes Suivant qu'ils
sont plus ou moins chargés de Sucs gras, Bileux
gélatinux & d'autres Sucs excrémentieux. Les Loupes les
chauds peuvent être les causes occasionnelles & primitives.
Les Loupes se forment à peu près par un degré insensible,
aussi en soulevant le point de la Vaisseaux du voisinage,
où on le faisant que force peu & très lentement, Le Sang
se coule avec une entière liberté & circule en dilatant
à proportion les Vaisseaux collatéraux; & qui fait



que les tumeurs n'attirent ordinairement aucune inflammation;
elles peuvent cependant par une cause accidentelle de leur
Skirrus ou carcinomatosa; être dépendre de la régénération
vicieuse des Sucs qui y sont renfermés.

On sait que les tumeurs inflammatoires ont pour
cause l'engorgement des vaisseaux Sanguins, qu'elles sont
accompagnées de douleurs, de pulsation, &c. &c. & que ces
tumeurs parcourent leur cours avec vitesse relative à
l'intensité de l'inflammation. Il y a une autre classe
de tumeurs qu'il ne faut pas confondre avec les tumeurs, quoi-
qu'elles soient pour l'ordinaire indolentes. Ce sont celles qui
conséquentes à l'écoulement qu'elles fournissent ont été nommées
cystes, miliaires &c.; les qu'elles dans leur principe ont
pour cause l'engorgement des vaisseaux & tout qu'elles
sont accompagnées d'une humeur visqueuse de couleur,
et d'un gonflement partiel dans leur augmentation; on peut
les considérer comme terminées par induration quand elles
sont à leur terme d'accroissement. Les tumeurs qui
viennent à la gorge sont à peu près de cette Nature, on les
nomme gonitres, La Matière qu'elles renferment est presque
Toujours enveloppée d'un Kiste ou d'une coque tantôt
solide, et quelque fois comme un Sif ou de la Bouillie. Il
en vient d'Apperçus qu'elles diffèrent des tumeurs
Communes sous le Nom de tumeurs; quoi que les moyens
Curatifs soient à peu près les mêmes. Il ne faut pas
confondre les engorgements Skirux qui viennent aux
glandes de la maxillaire ou parotides, elles acquièrent
souvent un Volume Considérable. Dans les tumeurs
de la gorge il n'y a d'autre moyen à employer que
l'extirpation.

En réfléchissant sur le Siège ordinaire de ces Tumeurs, sur la Structure des parties qu'elles occupent, sur la matière qu'elles contiennent; j'en paroissais qu'on peut raisonnablement penser, que l'engorgement se forme dans les follicules de la membrane adipeuse où les Sucs s'épaississent soit par la Crispation des cellules produite par la mauvaise qualité de ces mêmes Sucs, soit enfin par toute autre cause. Ces humeurs ne pouvant plus subir les loix de la circulation acquiescent à la coarctation, dilatent les follicules de la membrane adipeuse, pressent les liqueurs qui les environnent, ralentissent leur circulation, ainsi que celle qui soutient les vaisseaux blancs; Comme cela se fait petit à petit voilà la cause de l'indolence et de la persistance de la douleur dans ces sortes de tumeurs. Leur accroissement prompt ou leur fin la différence qu'on observe entre l'épaississement de la matière qui contient le kiste qui les renferme; La base plus ou moins étendue de ces tumeurs Vient de la plus ou moins grande quantité de Cellules qui Concourent à la formation du loupet. Or, si, suivant l'expression que souffrent les Sucs renfermés dans le kiste, on s'apperoit que les matières passent par différents degrés d'épaississement; aussi voit-on que quand on a fait l'ouverture d'un kiste par l'extirpation, dans ^{les} uns les Sucs ont la consistance de fromage épais, dans les autres la forme et la solidité d'une amande, surtout celles qui Viennent au front et à la face. Quand aux Contours j'en ai donné la raison plus haut.

Les anciens Crojoient que les loupes étoient



occasionnée par la dilatation des vaisseaux lymphatiques
à peu près sans doute. Comme la dilatation qu'on trouve
hydatides; Il en est ainsi de voir l'écoulement des urines; car
la lymphe en circulant plus, a arrêté le coagulum mais
en forme par des tumeurs de la Nature des Loupes.
Dionis dit qu'il y a plus d'apparence que le principe
de ces Tumeurs est le gonflement d'une petite glande;
mais Comme je l'ai fait voir plus haut, je ne fais pas
confondre le gonflement des glandes, à leur état Naturel
avec les Tumeurs qu'on appelle Loupes. Comme nous
savons d'ailleurs, les dernières Tumeurs n'ont leur Siège que
dans les téguments ou la membrane adipeuse, je n'ai
point démontré qu'il y ait dans leur Structure des
glandes; celles qu'on appelle milliaires n'ont point
en leur état soumis à la vie. Malgré cette assertion
seroit-il possible que ces glandes aussi petites puissent
produire des tumeurs d'un Volume aussi considérable,
cela repugne aux Connoissances Anatomiques & pathologiques
qu'on a. D'ailleurs l'observation, comme il sera prouvé,
n'est point d'accord avec le système.

Quant au diagnostic, on voit que les Loupes acquiescentes
plus ou moins de Volume relativement aux parties où
elles viennent, sont de la même nature & de la même espèce
ordinaire même aussi grosses que celles qui ont leur Siège
dans les autres parties du Corps. La raison en est
évidente, la peau de la tête & d'une partie de la face est
d'un tissu plus serré qu'à dos & au fol &c. Le tissu
cellulaire y est moins susceptible de dilatation, aussi
voit-on ces sortes de tumeurs plus solides. Moins
cavernieuses & par conséquent leur accroissement est plus lent.

celler au contraire qui viennent dans les autres parties
acquiescent souvent. Un Volume très-considerable; on m'a
vu de Gros Cônes Un pain cottois lièvre rond, j'en ai
vu un qui regnoit depuis la première Vertèbre du dos
jusqu'à la première de Lombe & qui avoit quatre
pouces de diamètre. Il en parle dans les Vrais Saitious
philosophiques d'une Loupe extra ordinaire qu'il voit à la
Machoire inférieure Un nommé Alexandre Palmer, je
la portoit depuis vingt sept ans; sa grosseur énorme et
les douleurs qu'elle lui faisoit de déterminer à se
la faire couper; elle pesoit vingt deux livres. Dans
l'opération je surpris un hémorrhagie considérable qui
fut arrêté au Lapoudre de Vitriol. La plaie fut
guérie promptement par des pans simples Methodiques.
Quand aux différences des Loupes, elles dependent des
endroits où elles viennent; on sait qu'elles peuvent être
Complicquées soit par un Vice des humeurs, Comme le
Scrophuleux de Mercur, ou par un Vice local comme
l'inflammation, soit enfin par le désordre qui arrive
dans quelque partie voisine, Comme l'œil & les
Articulations.

Le Prognostic est ainsi à établir, il est rare
que leur extirpation soit suivie d'aucuns fâcheux.
Leur grosseur & leur étendue méritent une attention.
Il y a des personnes qui les portent toute leur vie
sans en être beaucoup incommodés; Mais quand
les Tumeurs viennent à gêner les fonctions de quel que
partie, C'est alors qu'on demande les secours de l'Art.
Celles qui sont situées & adhérentes aux gros vaisseaux



meritait beaucoup d'attention, & je crains toujours
qu'il en plus grand de n'y pas touché qui d'ailleurs
L'opération.

Quand aux Moyens Curatifs on sait qu'il en est
de ces sortes de tumeurs comme de bien d'autres maladies,
Chacun propose son remède; C'est qui ne font pas de
L'air en son ordinaire mais un grand nombre qu'il
Vaut mieux comme d'ailleurs produit des effets merveilleux dans
Tous les cas. Je fais d'ailleurs de mesurer de ces sortes
de remèdes, qui viennent comme d'héritage & qui passent
de famille en famille. Ils sont toujours pour tout mérite
que de l'honneur qu'on en fait.

Les grands principes qui doivent nous conduire
dans la cure des tumeurs, se tirent de l'anatomie
qui jette d'abord dans chaque cas particulier les parties
auxquelles les tumeurs se sont attachées. Elles peuvent
être à des tendons, à des nerfs, à des vaisseaux
des vaisseaux considérables. Toutes ces différences font
varier le traitement en établissant ces procédés particuliers.

Les auteurs anciens ont proposé beaucoup de
remèdes topiques, j'en contenterai d'en rapporter un
certain nombre la liste étant trop grande pour faire
mention de tous. Ils employoient fréquemment ces
fontaines de mer & des cataplasmes emollients & résolutifs;
faits avec de la gomme d'absolu d'arnica &c. Quand
la tumeur étoit fondue, ils faisoient une division avec
des pinces de Ligo, de la monnaie de si mouton &c. &c. &c.
de terre & d'autres. Ils employoient encore les emplâtres
de Cicui, de Laudanum, de savon, de grenouilles &c.

Le murure, le Diabotum in Tute par M.^r Blondel
médecin de Paris. D'autres ont proposé de faire
La loupe entre les doigts où de La Battie avec de petites
palette pour en rompre Le kiste et ensuite mettre ce frot
Une plaque de plomb frottée de murure. Quel est le
praticien qui n'aura vu dans beaucoup de Cas l'insut
fissance de tous les remèdes? et S'ils ont réussi ce
n'étoit point dans les tumeurs qu'on appelle Loupe.
Les Modernes ont en retour à des Moyens plus
Surs. Ceux qu'ils ont proposés Sont trois, Savoir
L'extirpation, La ligature et les Caustiques: on emploie
l'un de ces Moyens de préférence relativement à la partie
que la loupe occupe, à sa grosseur et à sa figure.

Toutes les Loupes qui viennent à La tête ne Sont pas
ordinairement très grosses, elles ont Souvent une base
Large ce qui fait que la ligature ne peut être employée,
Les Caustiques pourroient occasionner des accidens,
on ne peut même La raison par la Communication
du kiste qui unifie La matiere avec l'esprit crâne
et adhéris avec La dure mere. On Sait que les caustiques
agissent en brûlant et en rougissant les tumeurs et que
Souvent leurs effets ne peuvent pas être bornés à la
partie où on les applique, malgré toutes les précautions
qu'on puisse prendre; il ne reste qu'un Moyen
Sur qui est l'extirpation, on Verra par l'observation
Suivante si j'ai raison de lui donner la préférence.

Une fille de Bartholin âgée de dix Sept ans, portoit
depuis d'oupe Une loupe à la partie Moyenne et
Supérieure du périnée droit, une des premières tumeurs
elle étoit très petite et n'occasioinnoit presque point



de douleurs. on n'employa aucun remède. Soit pour la
guérison ou pour empêcher l'accroissement, d'année
en année elle acquiesoit un plus gros volume. Cette
fille âgée de douze ans sentit à l'ora ses douleurs
de tête très vives qui étoient venues en même temps
de vertiges, comme les pouvoit attribuer qu'à la présence
de la tumeur, les douleurs primitives partant de
l'endroit qu'occupoit la loupe; comme on devoit à ces
causes que par les remèdes généraux. C'est-à-dire
les saignées les délayances les rafraîchissantes: les
douleurs passées ou diminuées ou ne pouvoit plus à la
cause du mal. La loupe s'accroissoit toujours
de plus en plus et continua dont j'ai fait mention
Et dessus elle parvint à acquiescer le volume d'un
petit melon; La base avoit deux pouces et demi de
diamètre et la tumeur étoit élevée de trois pouces
et formoit le champignon par son extrémité où
s'élevait. Outre les douleurs que cette fille ressentoit
de temps à autre elle ne pouvoit se lever que très
difficilement. Voici l'exposé de l'état où je trouvai
la loupe Lors que cette fille vint me consulter.
C'étoit au mois de Mars 1765. Après avoir
bien examiné la forme et l'étendue de la tumeur et que
je trouvai une indolence et une adhérence au périoste,
je la crus devoir à subir l'opération; elle y fut préparée
par une saignée et une potion purgative et réduite
à un régime convenable. à l'ora je fis une incision
cruelle avec la précaution la plus exacte d'en point

intérieur de Kiste. L'incision finie je voulus me servir
du moyen, que propose M. de Lamoignon, qui est de
disséquer les Lâmbreaux avec les doigts; Ce moyen est
Cruciel et très difficile à exécuter pour ne pas dire
impossible, je ne puis résulter en attendant si je consulte
d'un bon point de service. J'appais un Scalpel en forme de
Lancette bien tranchant, je désignai les Lâmbreaux
avec beaucoup de précaution jusqu'à la base de la tumeur.
A l'ora j'étais prêt à détacher le Kiste du péricrâne
j'appris à l'extraire intérieurement, l'opération finie
je rapprochai les Lâmbreaux sans couper leur angle.
Attention qu'il faut avoir Non seulement dans le cas,
mais toutes les fois qu'on est obligé d'opérer ces
incisions Cruciales à la tête. J'eus la précaution
d'apposer un peu d'Etharpe sèche à l'angle fond de
La plaie, le deuxième jour la Suppuration commença
à s'établir, le pansement fut fait ainsi que les suivants
à vu de Douce d'Arcus et d'un plat de Bétouac. en
cinq semaines j'obtins une cicatrice solide et bien faite.
Une Remarque que je ne passerai pas sous silence,
C'est que quand La tumeur fut enlevée, j'appris
une dépression considérable à l'endroit d'apariété
où La tumeur avoit son adhérence. Il est hors de doute
que ce enfoncement devoit former une bosse considérable
dans l'intérieur du crâne. on n'a presque point aperçu
de dérangement sensible dans les fonctions du cerveau
pendant que cette fille apporta cette tumeur; Au moins
Les accidents qui ont paru n'ont pas été de



Longue durée. Cela ne me paroit point difficile à
expliquer; Quand l'atmosphère à Commané à se
former les os du fémur n'étoient point encore ossifiés
parfaitement, étant pour le moins assez Subtile
dépense que les ligaments; les Surs Continus etant
Le Kiste faisant effort par gradation pour l'augmentation
de l'atmosphère, si la résistance n'étoit moindre en la
part du Parité, n'aurait point eu de arriere
une dépression au milieu de l'atmosphère, laqu'elle
dépression s'en auroit tant que l'atmosphère à augmenter
de volume, et que les fibres osseuses ont été Subtiles
et molles. Vous voyez Souvent ces en fait
faire des chutes où reçoivent des coups qui se font
les os du fémur, sans qu'il en résulte beaucoup d'accidents.
et Souvent la dépression des os dure toute la vie.
à plus forte raison un coup quel qu'il soit qui
Comprimera par gradation les os d'un enfant,
Il n'en résultera pour l'ordinaire que peu ou point
d'accidents.

Pour examiner Le Kiste et les Surs qu'il
Contenoit, j'ai mis l'atmosphère dans l'eau
tiède, j'ai trouvé que Le Kiste étoit formé en plusieurs
Lames extensibles et serrées Comme une membrane
Ligamentuse, les Surs étoient blancs et formoient
une matière Couverte et forme séparée par lames
Il y avoit de distance en distance des cloisons
membraneuses, et qui fortifie l'joint où j'en ai

que les tumeurs Communes sous le nom de loupes,
provenant naissances d'une les follicules de la membrane
externe, et non dans les glandes. Comme le genre
plusieurs tumeurs.

Les ^{loupes} qui viennent dans les différentes parties
de la face sont plus ou moins grosses. Suivant les
endroits qu'elles occupent, elles laissent plus ou
moins d'inconvenance relativement aux fonctions
des organes qu'elles peuvent gêner. Celles qui
provenant naissances aux paupières, aux angles
des yeux, au nez et aux lèvres, peuvent tellement
incommoder par leur volume, ou par les douleurs
qu'elles occasionnent, qu'elles déterminent ceux qui
en sont atteints à s'en débarrasser. Les moyens
curatifs varient relativement à l'espèce; celles qui ont
une base large et qui ne peuvent être atteintes par
la ligature, rentrent dans la classe de celles qui
doivent être extirpées.

Une femme M. Brando âgée de vingt-huit ans
portait depuis plusieurs années un loupé assez
considérable au grand angle de l'œil droit. Cette
femme a voit demandé un médecin tant les secours
des yeux de l'œil pour s'en débarrasser; dans l'espace
de deux ans elle subit deux fois l'opération, la 1^{re}
qu'elle eut pour tout succès d'empêcher l'évacuation
de la matière continue dans le kiste. Ce dernier
n'étant point détruit, quel que temps après l'opération
de s'en plus grosse qu'avant paravant, outre le
douleur qu'elle occasionnoit elle gênait beaucoup



Les Mouvements de la paupière. C'était l'état où je
trouvai cette femme lors qu'elle vint me consulter au
mois de May 1768. La tumeur étoit à lors grosse comme
un œuf de poule; je saignai. La tumeur s'altérait & venant
je la trouvais vaillante, je déterminai la malade à
me souffrir l'extirpation, elle y consentit. Elle fut
préparée par une saignée & mise au régime soutenable.
Je fis une incision cruciale à la peau après quoi je
dissequai charu & les lambeaux. Je parvins jusqu'à
la base de la tumeur, prenant bien garde d'interesser
le Kiste. Cela étant fait je détachai la tumeur par sa
base, ayant attention de ménager la communication de
la paupière pour éviter la difformité qui en auroit
résulté; j'en levai le Kiste & la matiere qu'il
contenoit: Elle fut par sans peine, cette femme
étant sujette à des accès de vapeurs, elle ne fut
attaquée pendant l'opération & tomba sans
connoissance & son agilité par des Mouvements
Convulsifs. Je rapprochai les lambeaux, je mis
d'un côté le fond de la plaie un peu de Charpie.
Sur le & le bandage soutenable pour à peu jeter
de tout. Le soir elle fut saignée, se trouvant
la tête fort enbarassée & de la fièvre. Le lendemain
la plaie fut pansée avec de Branne. D'arceut
& d'emplâtre de Bétoune par dessus. Comme
les poulx se trouvoient fort élevés, Beaucoup de charpie
à la peau & la tête toujours douloureuse, La

Saignée fut faite, la malade fut mise au régime, une plaume de laque et sa fraîcheur pendant son séjour de boisson pendant plusieurs jours.
Tous les accidents se calmèrent promptement; au bout de trois semaines de traitement et de repos, la plaie fut entièrement cicatrisée et sans difformité. Voilà trois ans que cette femme a été opérée et n'y a pas reparu que la loupé revienne.

Un jeune homme d'herbe longue âgé de vingt ans portait une loupé d'aspect très grosse comme un œuf d'écaille, située à la partie moyenne et inférieure de la paupière supérieure et pendait sur l'inférieure. Mais qu'il se fût posé de douleur et se trouvait fort incommodé. Et cet œil, c'était le droit, ne pouvant servir que très imparfaitement. Je vins me consulter au mois d'août 1786. L'ayant examiné j'en conclus l'extirpation, je le déterminai, je y fus préparé. Comme G. de S. Je fendis la peau de la loupé en quatre jusqu'à la base ayant attention d'en saisir l'intérieur de la paupière, je désignai à ce médecin des lambeaux, elle fut prise sans peine, les douleurs vives que ressentait le jeune homme lui faisoient faire beaucoup de mouvements, j'en portai de Kiste, non pas aussi facilement que dans les autres. L'opération finie je rapprochai les lambeaux, j'en fis plusieurs



Compresses imbuës d'un Collire résolutif, le malade
fut saigné le même Soir, le lendemain l'œil étoit
enflammé, mais cette inflammation à été dissimulée
aux remèdes appropriés. Un régime convenable et
des pansements méthodiques l'ont conduit à une parfaite
guérison dans l'espace de quinze jours. L'amaigris-
sement Continuoit L'un et l'autre Kiste étoit blanche et
séparés par feuillet, la poche ou Kiste étoit formé d'une
membrane extensible et tendue sur une Substence d'irritabilité.

Toutes les loupes qui ont la forme, la consistance
et la couleur de fesse dont j'ai fait mention, & de plus
sont dans la classe de fesses qu'il est difficile par
l'Instrument tranchant. Mais il y en a qu'il seroit
imprudent d'attaquer par cette Methode, on pourroit
les risquer d'avoir beaucoup d'avidités à combattre.
L'observation suivante en fournira un exemple.

Un jeune homme de l'âge de quinze ans
portoit depuis plusieurs années une loupe à la
partie Mojeune inférieure ou Labre Supérieure,
elle avoit la forme d'une grosse poire et desendoit
jusque sous le menton. Outre les douleurs que fesse
commune lui occasionnoit Etant en tend, il
éprouvoit une grande incommodité L'ors qu'il
voulait manger, étant obligé de relever cette tumeur
L'ors qu'il prenoit ses aliments. Dans les premiers
temps cette loupe n'étoit pas plus grosse qu'un noyau
de cerise, elle a augmenté successivement, au point

qu'en quatre ans, elle se parvint à l'état
de grossesse dont j'ai fait mention Cy dessus. C'étoit
dans le mois d'Avril 1766. que le jeune homme vint
me consulter. Ayant examiné avec attention cette
femme qui étoit d'un tempérament bilieux, et apprenant
d'elle d'appartenir à une femme de la Ville de Varignon,
je fus en douter sur le moyen que je mettrois en usage.
Je craignois l'hémorragie en employant l'instrument
traubant. La ligature me paroissoit à moi à
employer, je donnai cependant la préférence à
l'instrument; l'hémorragie considérable qui survint
d'abord, me détermina à employer tout en suite
la ligature de plus près en la base de l'utérus
qu'il me fut possible. en quatre jours j'eus la
bonte de faire tomber la ligature qui guérie
en huit.

Si j'aurois opiniâtement suivi l'opération
en l'instrument traubant, je m'aurois risqué
une hémorragie difficile à arrêter; la conséquence
que j'aurois été obligé d'employer auroit
été indubitablement occasionnée de cet accident.
Il est donc prudent dans ce sort de cas
de mettre en usage la ligature, tout moyen
qui s'en suit.

Quand aux Lèvres qui viennent au trou,



en aux extrémités, les moines Curatifs sont
expiés par les mêmes, quand les tumeurs ne
peuvent être extirpées par la ligature, il faut
employer l'instrument pour en faire l'extirpation,
mais quand la louppe est très grande et très
saine, même en usage la ligature est préférée.

Il est des cas où les Chirurgiens conviennent
mieux que les deux moines & de plus : C'est
quand les tumeurs sont grosses, ou très dures, ou
touchées, que leur cas est fort étendu, qu'on applique
à l'extirpation le Latum des Visqueux Variquans.
Cette méthode de la tumeur amène un épanchement
des sucs continu d'une difficile saignée ou poché.
À l'ors la ligature n'étant pas praticable, il serait
imprudent d'entreprendre l'extirpation par l'instrument
tranchant; les Chirurgiens méritent la préférence?
Leur effet remédie aux hémorragies qui pourraient
survenir, mais on prévient l'altération des
sucs frappés par l'air. On conçoit sans peine
qu'elle est l'effet des cautères dans le cas
qui est de rougir, de détacher et de briser
les parties solides et tout guérir, et se former
une escharre considérable aux dépens des
es derniers et des fluides : D'ailleurs les
effets ne s'obtiennent pas à la partie où ils sont
appliqués, les parties volatiles qui se détachent

prodiuise des effets sensibles jusqu'à la partie &
environnante, lequel prouva comme j'en ai eu
L'appréhension des humeurs, et des lésions
ordinairement des Vaisseaux Canaliculaires. L'observation
suivante prouva si j'ai raison en disant.
L'appréhension aux canalicules dans les intestins
de la b.


Un homme d'origine française d'un des rues
de Paris, portoit depuis quinze ans une Loupe
Considérable [elle étoit grosse comme un pain de trois
livres poids]. La partie postérieure et moyenne
du col, avoit pris toute la troisième et la quatrième
Vertèbre. elle lui étoit si à charge par sa
présence, qu'il étoit obligé d'employer un
Surpassement pour la soutenir (Bande de linge).
La couleur de cette Loupe étoit d'un rouge foncé
par dessus et différentes tâches blanches; Il y avoit
dans ces endroits d'épithème Noirs.
Ce homme consulta plusieurs Maîtres de l'Art
qui ne voulurent point en entreprendre l'opération,
Notamment Latour par aucun moyen, j'en
consultai à ce malheureux, d'après le Gardeau
Toute sa vie. Il étoit satisfait d'un pansement
comme, j'en consultai à un habile homme
comme par ses rares Talents dans l'Anatomie
et sa dextérité dans les opérations





De Chirurgie, je crus après avoir laissé
ce Corps étranger sans tenter les moyens
de guérison; Je donna la préférence au
Caustique, pour le succès qui si heureux que
l'homme qui délivré en moins de trois mois
d'une Loupe aussi considérable. On voit
par cet exemple de qu'elle importance il est de
bien choisir le moyen qu'on doit employer
relativement à l'espèce de Loupe & aux parties
où elles viennent.


Bourinme Chirurgien Major de l'armée
française au Siège de Corse, à l'hôpital
Royal militaire de St. Omer. à Bastia ce

^{février}
1. ~~juin~~ 1789.









No. 19.